

Naturtype	Typiske arter	Beskrivelse	Udbredelse i Danmark
A. Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter der koloniserer mudder og sand.	Kveller, strandgåsefod, strandfirling, knudefirling, dansk kokleare, smalbladet hareøre, spidshale, kødet hindeknæ.	Karakteriseres af kvellervade, men også saltpander og andre arealer med pionervegetation af enårige planter som strandgåsefod eller strandfirling indgår.	Pletvis langs dele af de danske kyster, men kun i Vadehavet findes den i mere sammenhængende udstrækning.
B. Vadegræssamfund.	Vadegræs.	Flerårig græsvegetation bestående af pionergræsset vadegræs som kan kolonisere mudderflader ved kyster med høj saltholdighed.	Vadegræs findes især i Vadehavet, men kan fx også findes i Mariager Fjord i Østjylland.
C. Strandenge (Atlantehavs-strandeng).	Harril, krybhvene, rød svingel, strandannelgræs, strandmalurt, alm. kvik, stiv kvik, engelskgræs, kødet hindeknæ, rødbrun kogleaks, strandmælde.	Plantesamfund som jævnligt oversvømmes af havet, fx ved vinterstorme. Der forekommer ikke vegetation af salttålende græsser og urter. Naturtypen omfatter mange undertyper, fx strandsump.	Strandenge findes især ved fjorde og vige samt langs kyster med lavvandede områder. Store, veludviklede strandenge findes mange steder i Danmark. Internationalt karakteriseres denne naturtype som Atlantehavs-strandeng.
D. Forstrand og begyndende klitdannelser.	Strandkvik, marehalm, strandarve, sandhjelme, østersøhjelme.	Den øvre tørre del af sandstrand der omlægges af vind. De første stadier i dannelse af klitter på den øvre strand eller forklitte ved foden af de høje klitter.	Naturtypen findes langs kyster der i særlig grad er udsat for havets og vindens kræfter. Den findes især langs Jyllands nord- og vestkyst, Læsø, Anholt, Vadehavssøerne, Nordsjællands kyst og Bornholms sydkyst.
E. Enårig vegetation på grusede/stenede strande/strandvolde.	Strandsennep, sodaurt, mældearter, pileurter, hestetunge, alm. kvik, gåsepotentil, strandhornskulpe, strandmandstro.	Enårig vegetation på grusede/stenede strande/strandvolde, opskyllet aflejres typisk som små volde og er rigt på kvælstofholdigt, organisk materiale. Visse flerårige arter hører med til plantesamfundet.	Findes almindeligt langs kyster i de indre danske farvande som er udsat for en vis bølgepåvirkning fra havet.
F. Flerårig vegetation på stenede strande.	Strandkål, strandarve, marehalm, strandfladbælg, alm. kvik, alm. røllike, strandbede, strandlimurt.	Flerårig vegetation på stenede strande som i visse tilfælde kan udgøre store komplekser af gamle strandvolde.	Kyster langs Kattegat, bælterne og Østersøen.