

Naturtype	Typiske arter	Beskrivelse	Udbredelse i Danmark
A. (9110) Bøgeskove på morbund uden kristtorn.	Bøg, bølget bunke, skovjomfruhår, ørnebregne og blåbær.	Bøgeskove på morbund omfatter skovpartier hvor bøg er det dominerende træ, hvor jordbunden er sur og der har fundet morbundsdannelse sted.	Naturtypen er almindelig over store dele af landet, bortset fra det sydlige og østlige Jylland hvor den stort set erstattes af naturtype B. Eksempler på naturtypen findes i dele af Rold Skov i Himmerland, ved Hald Inder sø ved Viborg og i Grib Skov i Nordsjælland.
B. (9120) Bøgeskove på morbund med kristtorn eller taks.	Kristtorn, taks, bølget bunke, smalbladet høgeurt, ørnebregne, blåbær, alm. gedeblad, alm. kohvede og krybende hestegræs.	Bøgeskove på morbund omfatter skovpartier hvor bøg er det dominerende træ, hvor jordbunden er sur og der har fundet morbundsdannelse sted. Bøgeskov på morbund opdeles ud fra mængden af naturlig kristtorn i to forskellige typer, se naturtype A. Eg kan dominere på visse arealer i naturtypen på grund af århundreders stævning og husdyrgræsning. Bøg vil overtage dominansen fra eg hvis skoven overlades til naturlig udvikling uden hugst og græsning.	Naturtypen findes almindeligt i dele af Jylland, hovedsageligt i den østlige og sydlige del. Eksempler på naturtypen findes i Velling Skov i Midtjylland, Munkebjerg Strandskov ved Vejle og i dele af Bolderslev Skov og Lindet Skov i Sønderjylland.
C. (9130) Bøgeskove på muldbund.	Bøg, hvid anemone, alm. guldnælde, skovmærke, enblomstret flitteraks, tandrod, alm. bingelurt, hulrodet lærkespore, miliegræs, ramsløg, knoldet brunrod, skovsalat og skovviol.	Skovbevoksninger hvor bøg er det dominerende træ, og hvor jordbunden hverken er sur eller meget kalkrig således at muldbund er den dominerende jordbund. Nogle skove har en rig underskov af bl.a. ær, elm og ask og en frodig skovbundsflora af urter og græsser. I andre skove, fx græsningsskove, vil underskov typisk mangle. Om foråret dækkes skovbunden mange steder af tidligt blomstrende arter som anemone og lærkespore.	Naturtypen er almindelig i Østdanmark, sjældnere mod vest. Eksempler på naturtypen findes i Pamhule Skov ved Haderslev, Gråsten-skovene i Sønderjylland og i dele af Gribskov og andre nordsjællandske bøgeskove.

Naturtype	Typiske arter	Beskrivelse	Udbredelse i Danmark
D. (9150) Bøgeskove på kalkbund.	Bøg, fingerstar, blågrøn star, bakkestar, bakkestilkaks, skovliljearter, rederod, storblomstret hullæbe, stor gøgeurt, tætblomstret hullæbe, fruesko og flueblomst.	Skovbevoksninger hvor bøg er det dominerende træ, og hvor jordbunden er meget kalkrig eller består af kalkrig plastisk ler, således at floraen kan rumme en række kalkelskende arter. Naturtypen findes ofte på jorde hvor undergrundens kalk træder frem eller ligger nær overfladen – ofte i tilknytning til skrænter. Der er som regel en frodig flora med særlige kalkelskende arter af buske, orkidéer, star eller græsser.	Naturtypen er sjælden i Danmark, men karakteristiske eksempler på naturtypen findes bl.a. i Rold Bjerghed i Nordjylland, på Trelde Næs og i Stagsrode Skov i Østjylland, i Allindelille Fredsskov på Midtsjælland og på Møns Klint.
E. (9160) Egeskove på mere eller mindre rig, ofte vandlidende jordbund.	Stilkeg, avnbøg, navr, småbladet lind, stor fladstjerne, jordbærpotentil, skovhundegræs, majblomst, bølget bunke, liljekonval, kranskonval, stor frytle og vintereg.	Skovbevoksninger hvor eg er det dominerende træ, og hvor jordbunden er mere eller mindre rig og ofte vandlidende. Jordbund og vandforhold gør at egen kan klare sig i konkurrencen med andre træer, gerne hjulpet af ekstensiv græsning. Det kan være tilgroningsskove, græsningsskove eller arealer i øvrigt med de jordbunds- og vandforhold som gør, at egen klarer sig over for andre slags træer.	Naturtypen findes spredt i Danmark, hovedsageligt i de østlige og sydlige dele af landet. Eksempler på naturtypen findes i skove langs nordsiden af Vejle Fjord, i Draved Skov i Sønderjylland og i dele af Almindingen og Slotslyngen på Bornholm.
F. (9179) Egeskove af vintereg i østlige (subkontinentale) egne	Vintereg, avnbøg, tarmvridrøn, navr, liljekonval, bakkestar, lind, løn, stilkeg og bøg.	Skove domineret af eg – med mere vintereg end stilkeg – i dele af Danmark med subkontinentalt præget klima, dvs. de østlige egne. Jordbunden er mere eller mindre rig, eventuelt sur. Skovtypen rummer plantearter med sydøstlig udbredelse.	I Danmark er naturtypen sjælden. De bedste danske eksempler findes i Ulvshale-skoven på Møn og i Ekkodalen på Bornholm. Naturtypen kan måske også træffes i små partier på Djursland og Sydsjælland.

Naturtype	Typiske arter	Beskrivelse	Udbredelse i Danmark
G*. (9180) Blandskove med ær, ask, elm eller lind på skråning.	Ær, ask, skovelm, avnbøg, hassel, eg, skovlind, storbladet lind, spidsløn, bøg, navr, alm. røn, druemunke, vedvarende måneskulpe, alm. bingelurt og mange bregnearter.	Løvskov på stejle, stenede skråninger med blanding af flere træarter i kronelaget, med varierende eller manglende dominans af én art. Naturtypen hører til i terræn hvor jordbunden er ustabil med løbende forvitring af forskellige bjergarter.	Små arealer i Danmark med naturskov på dalsider, i slugter eller andre steder som har haft ret ekstensiv skovdrift, så der ikke er sket en ensretning i sammensætningen af arter. Fx har dele af Bolderslev Skov i Sønderjylland en vegetation der svarer til typen. Uden for Bornholm er der dog næppe nogen arealer der lever op til de jordbundsforhold, der kræves. Typen er således sjælden eller måske helt manglende i Danmark.
H. (9190) Stilkegeskove og krat på mager sur bund.	Stilkeg, vortebirk, dunbirk, alm. røn, bævreasp, tørst, bølget bunke, blåtop, alm. kohvede, hvid anemone, majblomst, skovstjerne og ørnebregne.	Skove eller krat med dominans af eg på mager eller mager og sur jordbund (morbund), hvor det er stilkeg som er den dominerende egeart. Naturtypen har som regel været skov fra gammel tid, benyttet til hugst og græsning. Sådan benyttelse er ofte vigtig at fortsætte for at sikre naturtypen. Busklaget er svagt eller ikke udviklet, men der kan være mange bregner.	Typiske eksempler på naturtypen er egeskove på mager bund og en række egekrat. Uden for Jylland er naturtypen sjælden eller manglende. Eksempler på naturtypen findes i dele af Tinnet Krat i Midtjylland, Hvidding Krat i Østjylland og i Lovrup Skov i Sønderjylland.
I*. (91D0) Skovbevoksede tørvemoser.	Hundehvene, dunbirk, grå star, stjernestar, alm. star, næbstar, tørst, spidsblomstret siv, blåtop, skovstjerne, rødgran, skovfyr, tørvemosser (<i>Sphagnum spp.</i>), tranebær, mosebølle, engviol og revling.	Bevoksninger domineret af birk, skovfyr eller rødgran på fugtig til våd tørveholdig bund med højt grundvandspejl. Vandet er næringsfattigt, svarende til højmoser og fattigkær. Bundfloraen indeholder tørvemosser og andre planter knyttet til moser med næringsfattige kår.	Typiske eksempler er næringsfattige skovmoser tilgroet med birk eller nåletræer, som det kan ses i Gribskov i Nordsjælland og en række andre steder. Også nedbrudte højmoser tilgroet med birk hører ind under naturtypen som fx dele af Store Vildmose i Nordjylland og Holmegård Mose på Sydsjælland.

* Særlig prioriteret naturtype.

Naturtype	Typiske arter	Beskrivelse	Udbredelse i Danmark
J*. (91E0) Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.	Rødel, gråel, ask, hvidpil, skørpil, dunbirk, skovelm, gråpil, akselblomstret star, alm. fredløs, alm. hæg, alm. mjødukt, angelik, engkarse, engnellikerod, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kæmpestar, kærstar, kærtidsel, kåltidsel, lundfladstjerne, lundfredløs, milturt, padderokker, skovskræppe, skovstar, skovstorkenæb, stor nælde, sværtevæld, tyndakset star, vandkarse og vorterod.	Skove eller bevoksninger domineret af el og/eller ask ved vandløb, søer eller væld, dvs. på fugtig bund med en vis vandbevægelse. Jorden er tung, men iltet og frisk undtagen ved oversvømmelse. Bevoksningerne er ofte blandede med både el og ask og normalt med en frodig bundflora. Bundfloraen indeholder en række høje urter som trives med den rigelige tilgang af vand og næring.	Naturtypen forekommer i det meste af landet, dog mest almindeligt i de østlige egne. Mange steder er den indsnævret til en smal galleriskov langs vandløb, mens veludviklede eksempler kan dække større arealer med ellesump eller askebevoksninger. Eksempler på naturtypen findes i Silkeborgskovene langs Gudenåen, Mandbjerg Skov i Sønderjylland, Mølleådalene i Nordsjælland, Brobæk Mose ved Gentofte Sø ved København og Maribosøerne på Lolland.

* Særlig prioriteret naturtype.